

Papillons et Insectes Vlinders en Insecten



L'ECAILLE
Insecte lépidoptère du genre bombyx, l'espèce la plus connue (l'écaille de marbre ou hérissonne), s'attaque à la vigne.

DE MARTERVLINDER
Schubvleugelig insect van het bombyx geslacht, deze vlinder richt in de wijngaarden grote schade aan.



CLEOCÈRE
Lépidoptère, caractérisé par thorax arrondi, à antennes crénelées, il est de teinte jaunâtre. Sa chenille vit entre les jeunes feuilles des chênes et se chrysaliise dans un cocon informe dans les broussailles.

CLEOCERE
Schubvleugelig en gekenmerkt door afferonde borst ; gekantelde voelhoren. Geelachtige kleur. De rups leeft tusschen de jonge eikebladeren en verpoet zich in 't strijkgewas in een vormloos popje.



HANNETON
Coléoptère dont une vingtaine d'espèces, insecte lourd, herbivore, à l'état de larve vit en terre et dévore les racines ; sort au printemps ; insecte des plus nuisible ; son ver cause de grands dégâts.

MEIKEVERS EN LARVEN
Schildvleugelig insect. Er bestaan een twintigtal soorten ; lomp plantenetend insect ; als worm leeft hij in den grond en verslindt de boomwortels. Komt uit in de lente ; zeer schadelijk insect ; zijn worm veroorzaakt grote schade.



ENNYCHIE
Insecte lépidoptère ; famille des pyralidés. Vit surtout dans les régions montagneuses ; on en connaît trois espèces qui vivent presque dans toute l'Europe.

ENNYCHIE
Schubvleugelig insect : behoort tot de familie der « Pyralidés ». Houdt zich bijzonderlijk op in de bergachtige streken. Men kent drie soorten die meestal in Europa verblijven.



COCHENILLE
Habite les régions chaudes du globe, broyés ces insectes fournissent une teinture rouge magnifique. Se tiennent sur le nopal ; trouve son emploi dans un grand nombre d'industries différentes.



DORYPHORE, SA LARVE ET SES ŒUVFS
Genre coléoptère, taille médiocre couleurs vives et variées. On en connaît au moins 300 espèces ; cause des dégâts incalculables aux récoltes de pommes de terre. Adultes et larves dévorent les feuilles.



VER A SOIE, SON PAPILLON ET COCON
Originaire du Sud de la Chine, et élevé pour la reproduction ; il produit les fils de soie ; le ver devient chrysalide, puis papillon ; la ponte des œufs se produit au moment de la transformation de chrysalide en papillon.

ZIJDERUPS, VLINDER EN RUPS
Oorspronkelijk van 't Zuiden van China ; wordt gekweekt voor de voortbrengst. Hij verschaft zijde ; de worm werd pop en daarna vlinder. Het leggen der eieren gebeurt tijdens de vormverandering van pop in vlinder.



LUCANE
Genre coléoptère ; il est assez grand ; mandibules dentées, saillantes au-dessus de la tête ; les larves vivent pendant trois ans dans le tronc des chênes. Plusieurs espèces sont connues.

VLIENGEND HERT
Soort kever ; is redelijk groot ; boven den kop, nog al uitspringende getande knauwwerktenigen. De poppen leven gedurende drie jaar in de eikenstammen. Verschillende soorten zijn bekend.

SCHILDLUIS

Verblijft in de warme streken van den aardbol. Verbijzeld, leveren die insecten een prachtige karmijnrode verf af ; wordt gebruikt in talrijke soorten nijverheidsbedrijven.

LANSBLADKEVER, DE POP EN DE EIEREN

Soort kever van middelmatige grootte. Levendige- en afwisselende kleuren. Men kent minstens drie honderd soorten. Veroorzaakt onberekenbare schade aan den aardappeloogst. Volwassenen en larven verslinden de bladeren.



LIBELLULE ET SA LARVE
Genre insecte orthoptère comprenant plusieurs espèces appelées aussi demoiselles ; caractérisé par grosse tête ronde, grands yeux globuleux ; insecte très carnivore. Vit au-dessus des marais.

WATERJUFFER EN HARE POP
Soort rechtvleugelig insect ; er bestaan verscheidene soorten ; wordt ook juffer genaamd. Gekenmerkt door dikke ronde kop, en blaasvormige ogen. Vleeschetend insect. Leeft buiten de moeras.