

# les **CYPRINIDÉS**



DOCUMENTAIRE N. 581



*L'aspect du poisson doré (*Carassius auratus*) de la famille des Cyprinidés varie suivant le milieu où il vit. Ce poisson, quand il est élevé dans des milieux artificiels, possède en général une teinte rouge à reflets dorés, bien plus remarquable que dans le cas où il vit en liberté.*


Les Cyprinidés constituent une famille importante de l'ordre des Cypriniformes, qui comprend de nombreuses variétés ayant des dimensions, des habitudes et des caractéristiques bien différentes, mais qui vivent toutes dans les eaux douces, stagnantes ou à très faible courant: barbeaux, brèmes, ablettes, cyprins, carpes, gardons etc... Leur tendance à l'immobilisme est frappante. Plus ou moins indolents ils se bornent à rechercher leur nourriture, substances végétales flottant à la surface, entre deux eaux ou reposant sur le fond pierreux ou boueux dans lequel ils fouillent; cette ali-

mentation est complétée par des insectes, des larves ou de petits animaux aquatiques passant à portée de leur bouche. Certaines variétés sont recherchées pour leur chair, assez agréable, d'autre pour leurs formes étranges ou élégantes qui en justifient l'élevage pour aquarium. Ces poissons vivent aussi bien dans les régions chaudes que tempérées, à l'exclusion toutefois de celles d'Australie et d'Amérique du Sud. Dans le Sud de l'Europe on en compte une vingtaine d'espèces. Parmi elles figure la fameuse carpe (*Cyprinus carpio*) qui habite les eaux stagnantes ou peu agitées où elle rencontre une végétation abondante, sa nourriture préférée. Sa longueur est en moyenne de 50 cm. Cependant on a pu en pêcher dépassant 1 m de longueur et 20 kg de poids.


Le corps est d'une structure robuste, pourvu d'une nageoire dorsale, d'une grande nageoire caudale, de nageoires anales, ventrales, et pectorales, plus petites.

Les écailles sont d'une teinte brun-jaunâtre à reflets métalliques, qui tirent souvent sur le rouge ou le vert. Il existe également des variétés dépourvues d'écailles appelées carpes cuir et carpes miroirs, et qui toutes deux sont races sélectionnées. La carpe, à cause de sa chair assez estimée, est l'objet d'élevage dans de petits étangs, des bassins, ou des rizières.

Elles se reproduisent dans les mois chauds du printemps et du début de l'été. Les femelles déposent des centaines de milliers d'œufs en amas blanchâtre, s'accrochant à la végétation aquatique. Quelques jours plus tard les petits naissent et, après une période de deux à trois ans, ils atteignent le poids d'un kg. Le



*Le barbeau commun (*Barbus barbus*), de la famille des Cyprinidés, se trouve dans les mers d'Europe. Ce poisson aux formes élancées, d'une longueur courante de 50 cm., possède deux barbillons de chaque côté de la lèvre supérieure et quatre pour certaines espèces.*



*Le goujon (*Gobio gobio*), contrairement à la barbe ne possède qu'un barbillon de chaque côté de la lèvre supérieure. Le goujon vit dans différentes régions d'Europe et d'Asie. Il fait partie de la famille des Cyprinidés et de l'ordre des Cypriniformes.*

carassin (*Carassius carassius*) dont les chairs sont très peu prisées, est assez semblable à la carpe, dont il se distingue par ses dimensions plus réduites et par l'absence de barbillons. En France ce poisson se rencontre dans le Nord-Est à la limite de l'Allemagne, sa patrie d'élection. Il habite, en effet, les eaux d'Europe Centrale ou du Nord et presque toutes les parties de l'Asie. Il faut citer, en dehors de cette carouche dite encore gibèle, le *Carassius auratus* ou Poissons Rouge originaire de Chine et de ce fait appelé aussi dorade de la Chine.

Quelques-uns parmi les spécimens exportés en Europe par des voyageurs venant de Chine et du Japon furent donnés en hommage à la marquise de Pompadour vers 1750, et ils provoquèrent un véritable engouement dans toute l'Europe, suscitant curiosité et admiration à cause de la beauté de leurs teintes, des particularités de développement de leurs nageoires et de la singulière conformation de leurs yeux. On les rechercha pour peupler les bassins, les fontaines, ou les mettre en aquarium. Elevés avec des précautions attentives, surtout en maintenant l'eau où ils vivent à une température élevée pendant la croissance, ces petits poissons qui jusqu'à l'âge de 60 à 70 jours sont d'une teinte uniformément brunâtre et ne présentent pas de caractères apparents spéciaux, commencent à prendre une teinte brillante et variée: rouge-or, rouge flamboyant, blanche, rose, noirâtre avec des taches brunes, rouge vif, rosées. Les nageoires se développent d'une manière extraordinaire, en rubans ou en voiles qui ondulent gracieusement dans l'élément liquide; souvent leurs yeux saillent monstrueusement tels des télescopes, donnant à cet animal un aspect quelque peu fantastique. Ce poisson, sans doute encombré par ses somptueux atours, se déplace lentement, se tenant parfois immobile pendant de longues heures. La France ne procède pas à leur élevage, spécialité reconnue des Chinois, qui en ont multiplié à l'envie les variétés.


L'ablette (*Alburnus Albidus*) est un beau cyprinidé qui laisse rarement vides les filets des pêcheurs ama-



*La tanche (Tinca vulgaris), courante en Europe et en Asie de l'Ouest, était jadis considérée comme un poisson possédant des pouvoirs extraordinaires. Son corps à la forme ovale mesure 35 cm. environ et peut aller jusqu'à 50 cm. On la trouve couramment dans les lacs et les fleuves, ainsi que dans les petits étangs et les mares à fond boueux.*

teurs. C'est un petit poisson de 10 à 12 cm. de long qui peuple les eaux calmes et claires des lacs et des fleuves. De forme élancé, il est d'une teinte verdâtre sur les dos et vif argent sur les parties ventrales. Il vit en bancs très nombreux presque à fleur d'eau, en donnant la chasse habilement aux insectes qui se posent à la surface. Sa valeur alimentaire est assez médiocre mais, étant donné son abondance, c'est une proie facile pour ceux qui jettent l'hameçon à l'eau. L'*Alburnus alburnus* est une autre variété, que l'on trouve surtout en Europe centrale, dont les écailles aux reflets typiquement argentés sont utilisées pour conférer aux perles de culture leur pâle splendeur.

Le hotu (*Chondrostoma generi*), l'aloge, « l'âme noire », le nase (*Chondrostoma Nasus*) sont des espèces très voisines; elles sont vulgaires dans toutes les eaux de l'Europe. Ce sont des poissons dont la taille



*La scardola (Scardinius erythrophthalmus) est un Cyprinidé que l'on trouve aussi couramment dans les eaux des lacs de montagne italiens se trouvant à une altitude supérieure à 1.000 mètres. D'une longueur de 30 cm. il pèse en moyenne 1 kg. environ.*



*La sanguinerole (Phoxinus phoxinus), d'une longueur de 7 à 8 cm. à peine, se trouve couramment dans les eaux de l'Italie du Nord. La teinte de ce petit Cyprinidé varie énormément: le dos en est vert ou bleu, tandis que son abdomen est de couleur rouge.*



Le cavedano italien (*Leuciscus cephalus*) est un autre représentant de la nombreuse famille des Cyprinidés. Il atteint en moyenne une longueur de 50 cm.

varie entre 20 et 40cm., dont le museau proéminent est typique, et qui ont des formes élancées.

Le gardon rouge (*Leuciscus rutilus*) est un poisson que l'on trouve assez couramment, surtout en Europe Centrale et en Asie de l'Ouest. D'une longueur moyenne de 25 cm. il est de teinte bleuâtre ou verdâtre dans ses parties supérieures, tandis que les inférieures sont argentées et que les nageoires sont d'une teinte rouge ou orangée bien particulière. Les gardons vivent de préférence près des fonds rocaillieux, réunis en petites bandes, se nourrissant de substances végétales, de larves, d'insectes et de petits animaux aquatiques. Comme presque tous les cyprinidés mâles, ces derniers à l'époque de la reproduction se recouvrent de concrétions semblables à des perles.

Il existe de nombreuses variétés de gardons dont la taille est supérieure ou inférieure au gardon blanc commun (*Leuciscus rutilus*). Il faut toutefois bien les distinguer du rotengle (*Scardinius erythrophthalmus*),



On trouve fréquemment dans les eaux de l'Europe et de l'Asie de l'Ouest le gardon (*Leuciscus rutilus*). D'une longueur de 25 cm. (exceptionnellement 35 cm.) son poids atteint 400 gr. pour un beau spécimen.

qui prend en France les noms de rossette, de sergent ou de charin.

La tanche (*Tinca vulgaris*) est un des habitants les plus courants des eaux douces de toute la terre. Elle est très répandue en France bien que les pêcheurs n'apprécient pas toujours sa chair, qui choque les gourmets par son goût de fange parfois un peu accusé. Cet inconvénient disparaît d'ailleurs en grande partie, pour ne pas dire complètement, en gardant le poisson pendant quelques heures dans l'eau propre et courante. La tanche peut atteindre une longueur de 50 cm. et un poids de 5 kg. Sa teinte est très sombre sur le dos tandis qu'elle est jaunâtre ou d'un jaune-doré sur le ventre. Elle aime les eaux calmes des lacs ou des étangs et même des mares, ainsi que les méandres tranquilles des fleuves où elle se déplace peu ou pas du tout contre la vase du fond.

Le barbeau (*Leuciscus barbus*) est un des plus gros cyprinidés, qui peut atteindre parfois une taille de 70cm. mais qui oscille entre 0m.20 et 0m.60. On le trouve dans toute l'Europe et en Asie de l'Ouest. En France on en trouve deux espèces: le barbeau commun (*barbus fluviatilis*) et le barbeau méridional (*barbus meridionalis*). Le premier plus courant dans les régions du Nord et l'autre dans celles du Centre et du Midi. C'est un des rares cyprinidés qui s'adaptent bien aux eaux courantes et agitées, où il se tient à une assez grande profondeur. Ses chairs sont assez savoureuses mais les arêtes y abondent et, de ce fait, il n'est pas particulièrement apprécié. De toutes façons ce poisson est d'une pêche susceptible de belles captures. Ses quatre barbillons justifient ses appellations vulgaires de barbets ou barbarins.


La bouvière (*Rhondeus amarus*) est un petit poisson typique de l'Europe et de l'Asie du Nord qui ne dépasse pas une longueur de 10 cm. C'est le plus petit de tous les cyprinidés vivant dans les eaux de France, qu'il s'appelle la rosière en Picardie, le piastro dans le Gard ou le peultet en Bourgogne.



En Asie, dans les eaux de la péninsule de Malacca et des Iles de la Sonde on trouve un tout petit Cyprinidé fort gracieux, dont la longueur est d'environ 5 cm. La rasbora (*Rasbora heteromorpha*) poisson d'aquariums.

ENCYCLOPÉDIE EN COULEURS

# tout connaître



ARTS

SCIENCES

HISTOIRE

DÉCOUVERTES

LÉGENDES

DOCUMENTS

INSTRUCTIFS



**VOL. IX**

TOUT CONNAITRE

M. CONFALONIERI - Milan, Via P. Chieti, 8, - Editeur

Tous droits réservés

BELGIQUE - GRAND DUCHÉ - CONGO BELGE

AGENCE BELGE DES GRANDES EDITIONS s. a.  
Bruxelles