


STRAND- EN DUINVOGELS — 2. Jan-van-Gent en Zeezwaluw
ROOMSOEP LIEBIG „ASPERGES“: met fijne inlandse asperges

J. Liebig

Nadruk verboden

Verklaring op keerzijde




STRAND- EN DUINVOGELS — 1. Aalscholver en Alk
BONEN MET TOMAAT LIEBIG: het volledig voorbereid gerecht

J. Liebig

Nadruk verboden

Verklaring op keerzijde




STRAND- EN DUINVOGELS — 4. Scholekster en Plevieren
LIEBIG SOEP „TOMAAAT“: bereid met de fijnste, volrijpe tomaten

J. Liebig

Nadruk verboden

Verklaring op keerzijde




STRAND- EN DUINVOGELS — 3. Meeuwen
ROOMSOEP LIEBIG „CHAMPIGNONS“: lekkernij voor fijnproevers

J. Liebig

Nadruk verboden

Verklaring op keerzijde




STRAND- EN DUINVOGELS — 6. Kievit en Tureluur
LIEBIG CHICKEN SOUP: de kippensoep met „Belgische“ smaak

J. Liebig

Nadruk verboden

Verklaring op keerzijde



STRAND- EN DUINVOGELS — 5. Kluit en Wulp
LIEBIG SOEP „OXTAIL“: volgens alle regels van de kookkunst bereid

J. Liebig

Nadruk verboden

Verklaring op keerzijde

Oxo Bouillon per tas verbruiken of hem aanwenden tot de bereiding van de spijzen, is aan het organisme de steun van een buitengewoon krachtherstellende bouillon verzekeren.

2. — Jan-van-Gent en Zeezalw

De **Jan-van-Gent** (*Sula bassana*) is een vogel met wit gevederte, groot als een gans en met een sterke, puntige bek. Men ziet hem soms op ons strand in de herfst en in de winter. Zijn waar vaderland is Schotland: duizenden paren nestelen er op de kustrotsen. De vogel duikt om haring, makreel en sardijn te vangen, die zijn hoofdvoedsel uitmaken. Naakt uit het ei gekomen, krijgt hij eerst donkerbruine, witgestippelde veren en daarna pas volledig witte. Een merkwaardige bijzonderheid is de totale afwezigheid van neusgaten. De Jan-van-Gent moet door de snavel ademen.

De **Zeezalw** of **Visdiefje** (*Sterna hirundo*) is zeer algemeen op het strand. Zij is verwant aan de meeuwen en is een mooie vogel. Om aan de eisen van de vrouwelijke mode te voldoen werden de Zeezalwen zodanig vervolgd, dat hun aantal fel verminderd is. Met zijn puntige vleugels en zijn lange, diepgevorkte staart is het Visdiefje een buitengewoon vlieger. De vogel is herkenbaar aan zijn rode bek met zwarte punt, zijn helgekleurde borst, zijn zwarte kop. Hij nestelt achter de duinen op moerassige plaatsen. In rusttoestand hebben de jongen het uitzicht van stenen of aardkluiten. Zulk beschermingsmiddel tegen vijanden heet „mimicry“.

Compagnie LIEBIG, gesticht in 1865

De **Liebig Roomsoep „Champignons“** wordt aanbevolen om haar fijne smaak. Zij is daarbij merkwaardig gebonden en heerlijk smijdig.

4. — Scholekster en Plevieren

De **Scholekster** (*Haematopus ostralegus*) kan tot 40 cm lang worden. Zij is zwart, met witte buik en rode snavel, poten en ogen. Veel Scholeksters bebroeden hun eieren in de weiden achter de duinen. Het nest is een eenvoudige holte, waarin het wijfje drie grote, nogal puntige eieren legt, lichtroest van kleur en verschillend getekend. In tegenstelling met hetgeen beweerd wordt, voedt deze vogel zich niet met oesters: hij kan de schelpen niet openen. Zijn kost bestaat uit kleine weekdieren, wormen en krabben. Al de hiervoor beschreven typen zijn zwemmers, met vliezen tussen de tenen. De Scholekster en volgende vogels zijn steltlopers met lange poten en soms een klein zwemvlies.

De **Bontbekplevier** (*Charadrius hiaticula*) en de **Strandplevier** (*Charadrius alexandrinus*) zijn wat men mag heten wereldburgers: men vindt ze over de aarde verspreid, uitgezonderd in Zuid-Amerika en Australië. 's Winters trekken ze tot aan de Kaap de Goede Hoop. De Bontbekplevier heeft bek en poten van gele kleur, maar de bek heeft een zwarte spits; de halskraag is volledig. De Strandplevier heeft een onderbroken kraag, grijze poten en een volledig zwarte bek. Men heeft opgemerkt dat deze vogel zijn nest met kleine schelpen versiert. Beide plevieren hebben een lengte van ongeveer 20 cm.

Compagnie LIEBIG, gesticht in 1865

Liebig Chicken Soup is een smakelijke en krachtige bereiding, waardoor de uitstekende smaak van kippenbouillon ten volle — en goedkoop — kan gewaardeerd worden.

6. — Kievit en Tureluur

Alhoewel de **Kievit** (*Vanellus vanellus*) een bewoner is van vochtige weiden, ziet men hem zeer dikwijls op het strand, waar hij soms de winter doorbrengt. Hij is 35 cm lang. Zijn vederkleed is wit en metaalglanzig zwart. Op de kop draagt hij een zwart vederbosje. De poten zijn vleeskleurig. Het nest is een ondiepe holte in de grond, waarin het wijfje vier zeer ongelijk gevlekte eieren legt. Ze worden niet alleen door fijnproevers opgekocht, maar dienen ook als voedsel voor hermelijnen, wezels, bunzingen, reigers, kraaien en eksters. Aldus begrijpt men dat de soort met uitsterven bedreigd is. De Kievit is nochtans zeer nuttig, want hij verdelgt ontelbare schadelijke slakken, larven en wormen.

De **Tureluur** (*Tringa totanus*), 25 cm lang, is herkenbaar aan zijn vermiljoenrode poten. Men ontwaart hem nogal dikwijls op het strand in het najaar, op het ogenblik dat hij de drassige weiden verlaat. Een groot aantal trekt naar warme landen. Het wijfje legt vier eieren, die evenzeer gezocht worden als die van de kievit. Buiten de vogels waarover een en ander gezegd werd, zijn er nog vele andere, waaronder een groot aantal enkel voorbijtrekken, zonder zelfs gedurende korte tijd bij ons hun verblijf te kiezen.

Compagnie LIEBIG, gesticht in 1865

Dubbel Concentraat van Tomaten Liebig: gans de uitmuntende smaak, de aantrekkelijke kleur en de rijke voedingswaarde van vers geplukte tomaten.

1. — Aalscholver en Alk

De **Aalscholver** (*Phalacrocorax carbo*) is een echte visser. Hij voedt zich inderdaad uitsluitend met vis. Om zijn prooi te bemachtigen duikt hij tot 20 m diepte en komt soms op 50 m van zijn vertrekpunt terug aan de oppervlakte. Hij bereikt een lengte van 80 tot 90 cm. Zijn gevederte is bruin, met groenbronzene weerschijn. De Chinezen temmen de Aalscholver en richten hem af met het oog op de visvangst. Een ring om zijn hals — waaraan een lange koord om hem het duiken mogelijk te maken — belet de vogel de gevangen prooi te verorberen: zij wordt hem afgenomen.

De **Alk** (*Alca torda*), eveneens een zwemvogel, is ook een uitstekend duiker. Zij voedt zich met vis en weekdieren. Van uitzicht lijkt zij op de pinguin (vetgans): zwarte rug en witte borst, doch heeft er niets gemeens mede, gezien deze vogel van de antarctische streken tot vliegen helemaal onbekwaam is. De Alk heeft een zwarte bek, zwarte poten en de vleugels vertonen een witte dwarsstreep. Zij wordt bij ons in de herfst- en wintermaanden aangetroffen en keert in de lente weer naar haar broedplaatsen, de rotskusten van de Noord-Atlantische Oceaan: de Fär-Oer eilanden, IJsland en Noorwegen. De Alk is kleiner dan de Aalscholver: ongeveer 40 cm.

Compagnie LIEBIG, gesticht in 1865

Roomsoep Liebig „Asperges“: de heerlijke smaak van de fijnste asperges.

3. — Meeuwen

De **Mantelmeeuw** (*Larus marinus*) is de grootste meeuwsoort die ons land bezoekt. Zij wordt tot 75 cm lang. Haar kleed is wit, met blauwzwarte en leikleurige mantel, in de rug diep ingesnedden. De snavel heeft onderaan een helrode vlek; de ogen zijn zilvergrijs, de poten vleeskleurig of ongeveer wit. De vlucht van deze meeuw is zwaar, minder sierlijk dan die van de kleinere meeuwsoorten. De mantelmeeuw is zeer algemeen en vertoont zich vooral tijdens stormweer.

De **Zilvermeeuw** (*Larus argentatus*) is een weinig kleiner dan de voorgaande (65 cm). Haar mantel is lichter van kleur. Zij is een virtuoos van het sierlijk vliegen, vooral van het zweven. Aan de landbouw bewijst ze veel dienst: op de velden, achter de duinen, volgt ze de ploeg en verslindt duizenden insecten en larven. De Zilvermeeuwen nestelen in grote kolonies.

De **Kokmeeuw** (*Larus ridibundus*), vergeleken met de vorige soorten, is veel kleiner: zij is ongeveer 40 cm lang. Bek en poten zijn rood. In de zomer is de kop donker-rosbruin, maar in de winter wordt hij wit. Als het gure jaargetijde opdaagt treft men deze vogel bij duizendtallen aan in het binnenland, vooral langsheen de waterlopen. Kokmeeuwen nestelen insgelijks in kolonies. In ons land bestaan er enkele.

Compagnie LIEBIG, gesticht in 1865


Levermoes Liebig: met witte wijn, volgens een oud Elzasser recept bereid.

5. — Kluit en Wulp

De **Kluit** (*Recurvirostra avocetta*) is een zeer eigenaardige vogel, wegens zijn naar boven gekromde bek. De vogel bereikt 45 cm lengte. Zijn lange poten kenmerken hem als steltloper. Hij is wit met op de kop een zwarte, tot in de nek verlengde kap. De vleugels dragen zwarte, min of meer horizontale strepen. Soms ziet men de Kluit in de zee waden en zijn snavel heen en weer bewegen om het voedsel te grijpen dat zich binnen zijn bereik bevindt. De Kluit is een flink zwemmer en duikt gelijk de eenden, alsof hij op de kop stond. Het wijfje legt vier geelachtige eieren, grijs- en violetkleurig gestippeld en gestreept.

De **Wulp** (*Numenius arquatus*) is een steltloper, evenals de kluit, maar groter: 60 cm. Hij is gedeeltelijk bruin gevederd met roestkleurige, zwart gevlekte kop. De borst is geel en de buik wit. Slag- en staartpennen zijn zwart met witte rand. De bek van de Wulp is 15 tot 17 cm lang en naar omlaag gebogen; hij is week en plooibaar; alleen de punt is waarlijk hoornachtig. Het vlies dat de bek overdekt bevat zenuwdraden en tastknopjes. De neusgaten zijn verlengd tot in de snavelspits en bevatten pezen die toelaten alleen het uiteinde van de bek te openen en te sluiten. Dat is een groot voordeel bij het zoeken naar voedsel in het slijk: wormen, slakken, krabbetjes, enz.. Het wijfje legt vier olijfgroene, zwart en bruin gevlekte eieren.

Compagnie LIEBIG, gesticht in 1865



OISEAUX DE LA PLAGE ET DES DUNES


1. — Cormoran — Pingouin macroptère

CREME LIEBIG „ASPERGES“: aux fines asperges du pays

J. Liebig

Reproduction interdite

Explication au verso



OISEAUX DE LA PLAGE ET DES DUNES


2. — Fou de Bassan — Sterne vulgaire ou Sterne Pierre Garin

HARICOTS A LA TOMATE LIEBIG: le plat cuisiné complet

J. Liebig

Reproduction interdite

Explication au verso




OISEAUX DE LA PLAGE ET DES DUNES — 3. Goélands et Mouettes

POTAGE CREME LIEBIG „CHAMPIGNONS“: un vrai régal!

J. Liebig

Reproduction interdite

Explication au verso




OISEAUX DE LA PLAGE ET DES DUNES — 4. Huîtrier et Gravelots

POTAGE LIEBIG „TOMATE“: préparé avec des tomates mûries au soleil

J. Liebig

Reproduction interdite

Explication au verso




OISEAUX DE LA PLAGE ET DES DUNES — 5. Avocette et Courlis

POTAGE LIEBIG „OXTAIL“: préparé au vieux vin des îles

J. Liebig

Reproduction interdite

Explication au verso



OISEAUX DE LA PLAGE ET DES DUNES

6. Vanneau et Chevalier Gambette

LIEBIG CHICKEN SOUP: le potage poulet au goût „belge“

J. Liebig

Reproduction interdite

Explication au verso

Consommer le **Bouillon Oxo** à la tasse ou l'utiliser dans la préparation des mets, c'est assurer à l'organisme le puissant apport d'un véritable bouillon de viande extrêmement reconstituant.

1. — Cormoran — Pingouin macroptère

Le **Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*), est un véritable pêcheur. Il se nourrit d'ailleurs exclusivement de poisson. Pour capturer sa proie il plonge jusqu'à 20 m de profondeur et revient à la surface, parfois à 50 m du point de départ. Il atteint une longueur de 80 à 90 cm. Son plumage est brun, à reflets bronzés-verts. Les Chinois apprivoisent le cormoran et l'emploient à la pêche. Au moyen d'un anneau passé à son cou et attaché à une longue corde pour permettre le plongeon, ils empêchent l'oiseau d'avaler la proie capturée et la lui enlèvent.

Le **Pingouin macroptère** ou **Petit Pingouin** (*Alca torda* L.), palmipède comme le précédent, est un excellent plongeur. Il se nourrit de poisson et de mollusques. Il rappelle l'aspect du pingouin: dos noir et devant blanc, mais n'a rien de commun avec le vrai pingouin des terres arctiques australes, qui est totalement incapable de voler. Les pattes et le bec sont noirs. Les ailes présentent une raie transversale blanche. On le rencontre chez nous, surtout en automne et en hiver. Au printemps il retourne, pour la ponte, aux pays rocheux de l'Atlantique Nord: les îles Far-Oer, l'Islande et la Norvège. Cet oiseau est plus petit que le cormoran: environ 40 cm.

Compagnie LIEBIG, fondée en 1865

Le **Potage Liebig „Légumes”** est composé d'un „bouquet” de six légumes dont la délicate saveur s'harmonise au mieux avec le goût agréable de l'extrait de viande.

2. — Fou de Bassan — Sterne vulgaire ou Sterne Pierre Garin

Le **Fou de Bassan** (*Sula bassana*) est un oiseau blanc de la taille d'une oie, avec un bec fort et pointu. On le voit parfois sur nos plages en automne et en hiver. Sa véritable patrie est l'Ecosse: il en niche par milliers sur les rochers de la côte. L'oiseau plonge pour attraper les harengs, les maquereaux et les sardines qui constituent sa principale nourriture. Le plumage juvénile est brun foncé pointillé de blanc, bien que l'oiseau soit dépourvu de plumes à sa sortie de l'œuf. Une particularité extraordinaire est l'absence totale de narines: il est obligé de respirer par le bec.

Sterne vulgaire ou **Sterne Pierre Garin** (*Sterna hirundo*). La sterne est très commune sur le littoral. Elle est apparentée aux mouettes. C'est un très bel oiseau. Pour plaire à la mode féminine, il a été pourchassé de telle façon que le nombre en a fortement diminué. Grâce à ses ailes pointues et sa queue allongée, très fourchue, la sterne est un voilier extraordinaire. L'oiseau est bien reconnaissable à son bec rouge avec pointe noire, à sa poitrine de couleur claire, et à sa tête noire. Il niche derrière les dunes, dans les endroits marécageux. Au repos, les poussins ont l'aspect de pierres ou de petites mottes de terre. Ce moyen de protection contre les ennemis s'appelle „mimétisme”.

Compagnie LIEBIG, fondée en 1865

Potage Crème Liebig „Asperges”: préparé avec les meilleures asperges blanches du pays et du bon lait frais.

3. — Goélands et Mouettes

Le **Goéland** (*Larus marinus*) à manteau noir est la plus grande espèce de mouette fréquentant notre littoral. Elle a jusque 75 cm de longueur. Sa robe est blanche avec un manteau bleu-noir et ardoise à échancreuse assez profonde sur le dos. Le bec a une tache rouge vif à la partie inférieure; les yeux sont gris-argent et les pattes couleur chair ou blanchâtres. Le goéland a le vol plus lourd, moins élégant que celui des espèces plus petites. Il est très commun et on le voit surtout lors des tempêtes.

Le **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) est un peu plus petit que le précédent (65 cm). Son manteau est plus clair. C'est un virtuose du vol élégant, surtout du vol plané. Il est très utile à l'agriculture: dans les champs, derrière les dunes, il suit la charrue et dévore des milliers d'insectes et de larves. Il niche en grandes colonies.

La **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) est petite, comparée aux espèces décrites: elle a environ 40 cm de longueur. Bec et pattes sont rouges. En été la tête est d'un brun-roux foncé, mais elle devient blanche en hiver. Les mouettes rieuses se rencontrent par milliers à l'intérieur du pays pendant la saison froide, surtout aux abords des cours d'eau. Elles nichent en colonies dont il y en a quelques-unes en Belgique.

Compagnie LIEBIG, fondée en 1865

Le **Potage Crème Liebig „Champignons”** se recommande pour son goût délicat, son onctuosité remarquable et son velouté exquis.

4. — Huitrier et Gravelots

L'**Huitrier** (*Haematopus ostralegus*) peut atteindre 40 cm. Il est noir, à ventre blanc; bec, pattes et yeux rouges. Beaucoup d'huitriers couvent leurs œufs dans les prairies littorales. Le nid est une simple cavité où la femelle pond trois grands œufs coniques de couleur rouille clair, avec dessins variés. Contrairement à l'idée évoquée par son nom, l'oiseau ne se nourrit pas d'huîtres: il serait incapable d'en ouvrir les coquilles. Son ordinaire consiste en petits mollusques, vers et crabes. Alors que tous les types précédents sont des palmipèdes, avec palmure réunissant les doigts antérieurs, l'huître et les oiseaux suivants sont des échassiers à pattes allongées, et souvent à faible palmure.

Le **Gravelot à collier** (*Charadrius hiaticula*) et le **Gravelot à collier interrompu** (*Charadrius alexandrinus*) sont des oiseaux qu'on peut appeler cosmopolites: on les rencontre sur toute la terre sauf en Amérique du Sud et en Australie. En hiver ils émigrent jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. L'espèce à collier a les pattes et le bec jaunes, mais le bout du bec est noir. L'autre espèce a les pattes grisâtres et le bec complètement noir. On a constaté que le gravelot à collier interrompu décore son nid de petits coquillages. Les deux oiseaux ont une longueur d'environ 20 cm.

Compagnie LIEBIG, fondée en 1865

Mousse de foie Liebig: fond dans la bouche et plaît par son goût d'une finesse incomparable.

5. — Avocette et Courlis

L'**Avocette** (*Recurvirostra avocetta*) est un oiseau très caractéristique à cause de son long bec recourbé vers le haut. L'oiseau atteint une longueur de 45 cm. Ses longues pattes sont la caractéristique du véritable échassier. Il est blanc avec un capuchon noir qui s'allonge jusque dans le cou. Les ailes portent des stries noires plus ou moins horizontales. On voit parfois l'avocette se déplaçant dans la mer et mouvant son bec en va-et-vient latéral pour saisir la nourriture à sa portée. Il est excellent nageur et plonge à la façon des canards, comme s'il se tenait sur la tête. La femelle pond quatre œufs jaunâtres avec des points et des stries violettes et grisés.

Le **Courlis** (*Numenius arquatus*) est un échassier comme l'avocette, mais il est plus grand: 60 cm. Son plumage est en partie brun, la tête couleur rouille et noir, les rectrices et penes de la queue sont noires avec des bords blancs, la poitrine est jaune et le ventre blanc. Le bec du Courlis a 15 à 17 cm de long; recourbé vers le bas, il est assez mou et pliable. Seule la pointe est vraiment cornée. La membrane recouvrant le bec contient des nerfs et des papilles nerveuses. Les narines se prolongent jusqu'à l'extrémité du bec. Il y passe des tendons qui permettent à l'oiseau d'ouvrir et de fermer uniquement le bout du bec; c'est là un énorme avantage pour la recherche de sa nourriture dans la vase: vers, limaces, petits crabes etc... La femelle pond quatre œufs olivâtres avec taches noires et brunes.

Compagnie LIEBIG, fondée en 1865

Double Concentré de Tomates Liebig: toute la saveur exquise, la couleur appétissante, la richesse nutritive de tomates fraîchement cueillies.

6. — Vanneau et Chevalier Gambette

Bien que le **Vanneau** (*Vanellus vanellus*) soit un oiseau des prairies humides, on le voit très souvent au littoral où il passe parfois l'hiver. Il a 35 cm de long; son plumage est blanc et noir à reflets métalliques. La tête est surmontée d'une huppe noire. Les pattes sont couleur chair. Le nid est une cavité peu profonde dans le sol où la femelle pond quatre œufs diversement mouchetés. Ces œufs ne sont pas seulement recherchés par les gourmets, mais servent aussi de nourriture à l'hermine, à la belette, au putois, au héron, à la corneille et à la pie. Dès lors, on le conçoit, l'espèce est menacée. Le vanneau est cependant un oiseau très utile car il détruit un nombre considérable de limaces, de larves et de vers nuisibles.

Le **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) a une longueur de 25 cm. Reconnaissable à ses pattes rouge vermillon, on le rencontre très souvent au littoral, surtout à l'arrière-saison, moment où il quitte les prairies marécageuses. Un grand nombre émigre vers les pays chauds. La femelle pond quatre œufs qui sont recherchés comme ceux du vanneau.

En dehors des oiseaux dont nous avons dit quelques mots, il y en a un grand nombre d'autres parmi lesquels beaucoup sont seulement des oiseaux de passage.

Compagnie LIEBIG, fondée en 1865