



Ri-Ri
DEMARET



Chiroptères - Handvleugeligen



MOLOSSE

Chauve-souris de taille médiocre à museau large et renflé, tête forte et hautes oreilles. Ce mammifère chiroptère habite l'Amérique centrale et méridionale.

MOLOSSE

Vleermuis van middelmatige grootte; breeden en gezwollen snoet. Dikke kop met hooge ooren. Dit handvleugelig zoogdier bewoont Centraal- en Zuid-Amerika.



GLOSSOPHAGE

De taille médiocre, langue longue garnie de grandes papilles; museau très saillant, comprend plusieurs espèces de chauves-souris. Diurne; longueur 6 à 7 cm.; originaire des Antilles.

GLOSSOPHAGE

Van middelmatige grootte; lange tong, voorzien van lange tepelvormige wratten, ver uitstekende snoet; bevat verscheidene soorten vleermuizen. Dagmuis, van 6 tot 7 cm. lengte. Oorspronkelijk van de Antillen.



RHINOLOPHE

Chauve-souris appelée aussi fer à cheval; taille médiocre commune en France et dans l'ancien monde où elle est répandue; niche dans les ruines, rochers, greniers; insectivore; vol bas et lent.

RHINOLOPHE

Vleermuis ook nog hoefijzer genaamd. Middelmatige grootte. Gemeen in Frankrijk en in de Oude-Wereld waar ze verspreid is. Verschuilt zich in de puinen, rotsen en zolders. Eet insecten; vliegt laag en traag.



RHINOPOME

Petite chauve-souris grise; caractérisée par longue et fine queue et nez applati. Abondant dans les ruines souterraines d'Egypte. Insectivore.

RHINOPOME

Kleine grijze vleermuis; gekenmerkt door lange en fijne staart en ook platte neus. Overvloedig in de onderaardsche puinen van Egypte. Insectenetend.



NOCTILION

Chauve-souris de petite taille à longues ailes. Se trouve dans l'Amérique tropicale, et répandu du Pérou au Brésil; remarquable par sa lèvre supérieure fendue.

NOCTILION

Kleine vleermuis met lange vleugels. Te vinden in tropisch Amerika en verspreid van Peru tot Brazilië. Gekenmerkt door gespleten bovenlip.