



Ri-Ri
DEMARET



Passereaux — Muschachtigen



BENGALI

Joli petit oiseau habitant les contrées chaudes de l'Afrique, de l'Arabie et de l'Inde. D'un coloris chaud et brillant. Il est exporté d'Afrique vers nos régions.

BENGALI

Prachtig vogeltje, te vinden in de warme streken van Afrika, Arabië en Indië. Warm en schitterend koloriet. Is van Afrika naar onze streken overgezet.



EDOLIISOMA

Magnifique petit oiseau gobe-mouche, propre à la Nouvelle-Guinée, caractérisé par sa teinte violacée, et large queue; oiseau agile et arboricole.

EDOLIISOMA

Prachtig vliegenvangertje, eigen aan Nieuw-Guinea; gekenmerkt door violetachtige kleur; vlugge vogel met breede staart en op boomen levend.



Gobe-mouche

Taille petite avec bec aplati, avec petite touffe de poils à sa base; insectivore. Commun en France; on le chasse pour sa chair; arboricole.

Vliegenvogeltje

Is klein en heeft platte bek; heeft onderaan een pluimbosje; is insectenetend; gemeen in Frankrijk; wordt gejaagd voor zijn lekker vleesch. Leeft op de boomen.



GALERIDA

Sous-genre d'alouette huppée dont on connaît une douzaine d'espèces propre à l'ancien monde, dans les plaines désertiques; une espèce habite l'Europe; insectivore.

GALERIDA

Onderafdeeling van den kuif-leeuwrik, waarvan men er een dozijn soorten kent. Is eigen aan de Oude-Wereld, in de woestijnsche vlakten; één soort bewoont Europa. Is insectenetend.



RHIPIDORNIS

Beau petit paradisier fort rare, propre à la Nouvelle-Guinée; caractérisé par courte queue terminée en forme de rostre. Vit dans les forêts des plus hautes montagnes.

RHIPIDORNIS

Schoon paradijsvogeltje; zeer zeldzaam. Eigen aan Nieuw-Guinea. Is gekenmerkt door korte staart die in sloopsvuit eindigt. Leeft in de wouden der hoogste bergen.



CONOPHAGE

Propre à l'Amérique du Sud tropical; habite les grandes forêts; oiseau moyen à queue nulle, à bec court et large, à pattes hautes et longues, à ailes courtes. C'est un insectivore.

CONOPHAGE

Eigen aan tropisch Zuid-Amerika. Verblijft in de grote bosschen. Middelbare grootte en geen staart; korte breede bek; hooge et lange pooten. Korte vleugels en is insectenetend.



EURYLAIMÉ

La taille de cet oiseau est de celle d'une grive; il a le bec large et crochu. Il vit d'insectes et se tient au bord des eaux. Caractérisé par queue longue; oiseau coloré; habite les régions sauvages de la Malaisie.

EURYLAIMÉ

Heeft de grootte van de lijster; breede en kromme bek; voedt zich met insecten en verblijft aan de wateroevers. Gekenmerkt door breede staart en schoone kleuren. Verblijft in de wilde streken van Malaisië.



FLORISUGE DE TABAGO

Sous-genre de topaze de petite taille, de forme magnifique et coloré; habite le Brésil oriental et l'île Tabago; il a le bec fort et un peu bombé à son extrémité; il est arboricole.

FLORISUGE DE TABAGO

Onderafdeeling der kleinsoortige "Topazen"; prachtige vorm en schitterend gekleurd. Houdt zich in 't Oosten van Brazilië en in 't eiland Tabago.



CINNYRIS (JULIE)

Propre aux régions tropicales d'Afrique; très bel oiseau. Se tient de préférence sur les grands arbres des forêts. Son plumage est coloré, caractérisé par bec long et terminé par pointe aiguë.

CINNYRIS (JULIE)

Eigen aan de tropische streken van Afrika. Zeer schoone vogel; verblijft liefst op de grote boomen der bosschen. Gekleurd gevederte. Gekenmerkt door langen bek in scherpe punt eindigende.